

KULLANMA TALİMATI

TANTUM® %5 jel Haricen uygulanır.

- **Etkin madde:** 50 g jel içinde 2,5 g benzidamin HCl bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** İzopropil alkol, gliserin, hidroksi etil selüloz, lavanta esansı ve demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TANTUM® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TANTUM®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TANTUM® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TANTUM®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TANTUM® nedir ve ne için kullanılır?

- TANTUM®, yangı önleyici ve yangı önleyici etkisine bağlı olarak ağrı kesici özelliklere sahip bir non-steroid antiinflamatuvar ilaçtır (NSAİİ; steroid yapıda olmayan yangıyı önleyen ilaç).
- TANTUM®, 50 ve 100 g'lık, alüminyum tüp ambalajlarda sunulur. Renksiz, berrak jel. Kolay yayılır ve lavanta kokusu duyulur.
- Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde analjezik ve antiinflamatuvar olarak etkilidir.
 - Osteoartrit, romatoid artrit, periartrit, tendinit, tenosinovit ve bursit gibi romatizmal hastalıklar,
 - Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,
 - Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistemi hastalıkları

2. TANTUM®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TANTUM®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer TANTUM®'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

TANTUM®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- TANTUM®'u cilt bütünlüğünün bozulmuş olduğu açık yaralara sürmeyiniz,

- Diğer haricen uygulanan ilaçlarda olduğu gibi uzun süreli kullanılmasının hassaslaşmaya sebep olabileceğini göz önünde bulundurunuz,
- Gözler ve mukozal yüzeylerle (ağız içi ve burun içi mukozası gibi) temasından kaçınınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TANTUM®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TANTUM®'un yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli klinik deneyim bulunmadığından TANTUM®'u hamilelik sırasında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığından emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

TANTUM®'un topikal kullanımı, araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez.

TANTUM®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TANTUM® ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TANTUM® nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** Hasta bölgeye ve/veya civarına hafif ovarak günde 2-3 defa sürülür. Tüpten dışarı sıkılacak jel miktarı 35 mm-85 mm (1-2 g) uzunluğunda olmalıdır.

Tedavi süresi cerrahi travmalarda 3-5 gün, diğer travmatik durumlarda 5-7 gündür. Doktorunuz TANTUM® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

- **Uygulama yolu ve metodu:** Hasta bölgeye ve/veya civarına hafif ovarak sürülür.

- **Değişik yaş grupları**

- **Çocuklarda kullanımı:** Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

- **Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları:** Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Eğer TANTUM®'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TANTUM® kullandıysanız

TANTUM®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TANTUM®'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TANTUM® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TANTUM®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az) olarak görülen yan etkiler:

- Cilt tahrişine bağlı kaşıntı
- Kızarıklık
- Deride içi sıvı dolu kabarcıklar
- Işığa karşı duyarlılık reaksiyonları

Yukarıda belirtilen yan etkilerin ilaç kesilince kaybolduğu bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TANTUM®'un saklanması

TANTUM®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra TANTUM®'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz

Ruhsat Sahibi: A.C.R. Angelini F.Roma-İTALYA lisansı ile Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş.
RSD 4, Nispetiye Mah. Aytar Cad. Fecri Ebcioğlu Sok. No: 4, Zemin Kat Levent, Beşiktaş - İSTANBUL

Tel: (+90 212) 266 24 23

Fax: (+90 212) 266 24 22

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası – KOCAELİ

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı 03.10.2013 tarihinde onaylanmıştır.