

TANTUM VERDE® 120 ml gargara kısa ürün bilgisi: TANTUM VERDE® 120 ml gargara formülü: 120 ml gargara içinde 180 mg benzidamin HCl bulunur. Endikasyonları: Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivitis, stomatit, farenjit, tonsilit ve aftöz lezyonlarda; hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında semptom giderici olarak ve periodontal girişimlerden sonra kullanılır. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Bir ölçek (15 ml) gargara solüsyonu ile 20-30 saniye ağızda çalkalama ve/veya gargara yapıldıktan sonra kalan kısım dışarı atılır; yutulmaz. Hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, ihtiyaca göre bu işlem genellikle günde 2-3 defa 3-4 saat ara ile tekrarlanır; gerektiğinde 5 defaya çıkılabilir. Tedavi süresi, vakasına göre ortalama 2-7 gün arasındadır; radyasyon mukozitlerinde tedavi, doktor denetiminde 15-20 gün sürebilir. Uygulama şekli: TANTUM VERDE®, ağızda çalkalamak ve/veya gargara içindir; bu işlemden sonra kalan kısım yutulmaz; dışarı atılır. Yanma ve karıncalanma şikayeti fazla olanlarda ilaç biraz sulandırılarak gargara yapılır. İÇİLMEZ. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır. Pedyatrik popülasyon: 12 yaşından küçük çocuklarda, yeterli klinik deneyim bulunmadığı için TANTUM VERDE® gargara, 12 yaş ve üzerinde kullanılabilir. Geriyatrik popülasyon: Bu popülasyonda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır. Kontrendikasyonlar: Benzidamin HCl'e ve/veya TANTUM VERDE® içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Gözle temastan kaçınılmalıdır. Uzun süreli kullanıldığında hassaslaşma durumuna neden olabilir; böyle bir durumda ilacı kesip hekime haber verilmelidir. Sınırlı sayıda hastada orofarenks ülserleri daha ağır patolojilerin bulgusu olabilir. Semptomların üç günden fazla sürdüğü durumlarda, hasta ihtiyaca göre doktoruna veya diş hekimine başvurmalıdır. Asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ'lere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda benzidamin kullanılması önerilmez. Geçmişte bronşiyal astım nöbeti geçirmiş olan kişilerde bronkospazm görülebileceği için dikkatle uygulanmalıdır. Spor yapanlarda: Etil alkol içeren ilaçların kullanılması bazı spor federasyonları tarafından endike olan alkol konsantrasyonlarının sınırlarına göre doping testlerinde pozitif sonuçlara neden olabilir. TANTUM VERDE®'nin içeriğinde bulunan metil paraben alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri: Bildirilmemiştir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Özel popülasyonlar üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pedyatrik popülasyon: Pedyatrik popülasyon üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır. Gebelik ve laktasyon: Gebelik kategorisi, C'dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): TANTUM VERDE®'nin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara herhangi bir etkisi olduğu ve doğum kontrolü için kullanılan ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir. Gebelik dönemi: Gebelikte yeterli sayıda çalışma olmadığından kullanılmamalıdır. Laktasyon dönemi: Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığından emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Üreme yeteneği/Fertilite: TANTUM VERDE® tedavisinin insanlarda fertilitiyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: İlacın önerilen dozlarda topikal kullanımı araç ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkilemez. İstenmeyen etkiler: Klinik çalışmalarda ortalama yan etki insidansı, %4,5 olarak bulunmuştur. Yaygın: Dil ve ağızda geçici uyuşukluk, yanma ve karıncalanma hissi (bu yan etkiler genellikle ilacın biraz sulandırılması ile azalır). Yaygın olmayan: İştah kaybı, baş dönmesi, tat bozukluğu, bulantı, kusma, ağızda kötü tat hissi, ağız kuruluğu veya salya artışı. Seyrek: Uyku bozukluğu. Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (bu reaksiyonlar kaşıntı, döküntü, ürtiker, fotodermatit ve bazen de laringospazm veya bronkospazm ile ilişkili olabilir). Doz aşımı ve tedavisi: Çok nadir olarak benzidaminin, 3 mg pastillerin dozundan yaklaşık 100 katı yüksek dozda oral uygulamasından sonra çocuklarda eksitasyon, konvülsiyonlar, terleme, ataksi, tremor ve kusma gibi doz aşımı semptomları bildirilmiştir. Akut doz aşımı durumunda sadece semptomatik tedavi uygulanabilir; kusma provoke edilerek veya mide lavajıyla mide boşaltılır. Destekleyici tedavi verilerek ve yeterli hidrasyon sağlanarak hasta gözlem altında tutulur. Geçimsizlikler: Bilinmemektedir. Raf ömrü: 36 ay. Saklamaya yönelik özel tedbirler: 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajın niteliđi ve ieriđi: 120 ml renksiz cam ŐiŐe ve pp kapak. Ruhsat Sahibi: Angelini İla San. ve Tic. A.Ő. RSD 4, Nispetiye Mah. Aytar Cad. Fecri Ebciođlu Sok. No: 4, Zemin Kat Levent, BeŐiktaŐ – İSTANBUL. Ruhsat numarası:161/1. İlk ruhsat tarihi: 15.07.1992 Ruhsat yenileme tarihi: 20.09.2010 KDV dahil perakende satıŐ fiyatı ve fiyat geerlilik tarihi: 92,01 TL. (25.12.2023). Yasal kategorisi: Reete ile satılır. Daha geniŐ bilgi iin firmamıza baŐvurunuz. <https://www.angelinipharma.com.tr/>